

# Septogin<sup>®</sup>

SPRAY



Prodotto brevettato

**Modalità d'uso:** Spruzzare il prodotto 3/4 volte sull'assorbente o salvaslip a distanza di circa 15 cm al momento dell'utilizzo. Tale operazione può essere ripetuta ad ogni cambio di assorbente o salvaslip.

**Costo medio giornaliero di utilizzo  
lire 400/euro 0,21**

**Bibliografia:**

- Cronin E.: contact dermatitis - Edimburg 1986 - Derm. Ost 9/86
- Hiort N: Contact Dermatitis in Women 1991 Acta Derm.
- Edward L: Desquamativ vulvitis Der Clin 1992
- Zanetta G: Terapia della candidosi vulvovaginale 1990 - Giorn. ital. Ost. Gin.

- Elsner P.: Multiple parameter assessment of vulvar irritant contact dermatitis - contact dermatitis. 7/1990.
- Locatelli: studio su preparato spray distribuito su assorbenti igienici - Univ. di Pavia 1992 - Med. Prev. 6/93
- Sobel, Kaye: Adherence of bacteria to vaginal epithelial cells at various times in the menstrual cycle - Inf. immunology 32:194 - 1981

**DERMATITI DA CONTATTO,  
MARCATI EFFLUVI E  
INFEZIONI GENITO URINARIE  
IN GINECOLOGIA**



# Septogin<sup>®</sup>

SPRAY

**AIUTA A RISOLVERE IL PROBLEMA**

 **STERLING FARMACEUTICI**

# Septogin SPRAY®

È un prodotto brevettato per prevenire i fenomeni irritativi vulvari e le relative complicanze infettive.

È costituito da una miscela di particolari principi attivi a bassa volatilità:

- **Composto cationico:UBF+ cetiltrimetilammoniocloruro**

✓ Esercita una spiccata azione microbica nei confronti dei più comuni batteri e funghi (compreso **Candida Albicans**) che spesso sono presenti negli assorbenti e salva slip.

✓ Blocca i processi fermentativi dei liquidi organici (urina, sangue, secreti vaginali) impedendo la formazione di **cattivi odori**.

**Estratti glicolici di:**

- **Malva silvestris,**
- **Lavandula officinalis,**
- **Camomilla recutita**

✓ Esercitano attività antipruriginosa, antinfiammatoria, lenitiva, riepitelizzante, antisettica a favore dei genitali esterni e della zona perineale.

- **Dimethicone copolyol**

✓ Crea sulla cute un microfilm traspirante e protettivo che impedisce il contatto con i liquidi organici (effetto barriera).

## ESCHERICHIA COLI

Con siero dopo contatto per 6 ore	Trattati	Non trattati	Riduzione %
Agar Mueller-Hinton	5	214	97,7%
Agar Leethen	6	177	96,6%

## CANDIDA ALBICANS

Con siero dopo contatto per 6 ore	Trattati	Non trattati	Riduzione %
Agar Mueller-Hinton	18	168	89,2%
Agar Leethen	6	31	80,6%

Istituto Igiene e Medicina Preventiva Università di Pavia, 1992

I dati numerici delle colonne "trattati" e "non trattati" sono riportati all'unità e rappresentano valori medi ricavati dai risultati di 21 prove effettuate con prodotto utilizzando tecnica spray di impregnazione di assorbenti igienici per donna di nota marca, al fine di valutarne l'attività microbica.

Istituto Igiene e Medicina Preventiva Università di Pavia 1992

# Septogin SPRAY®

Grazie al particolare complesso cationico e a specifici estratti naturali garantisce attività igienizzante, deodorante, antipruriginosa, dermoprotettiva indicata nelle "dermatiti da contatto", vulviti, vulviti irritative, vulvovaginiti, prevenendo nella donna possibili infezioni genito-urinarie.

Coadiuvante nelle terapie specifiche delle vulvovaginiti, dopo la chirurgia ginecologica e uroginecologica, nell'incontinenza urinaria.

**Il prodotto è privo di effetti collaterali  
non contiene propellenti**